



Coelioscopie



Vasectomie



Principe	Il existe principalement 3 méthodes de ligature des trompes : <ul style="list-style-type: none"> • La mise en place de clips ou d'anneaux sur les trompes • La coagulation des trompes • La coagulation et la section des trompes (salpingectomie partielle) 	Section d'une partie du canal déférent reliant le testicule aux vésicules séminales et à la prostate
Délai de réflexion avant le geste	4 mois	4 mois
Délai avant efficacité	Immédiat	Patienter encore 3 mois avant efficacité pleine (=> contraception compl.)
Cicatrices	Nombril ± racine des poils (pubis)	Non (ou toute petite cicatrice à l'arrière des bourses)
Reversibilité	Partiellement : fertilité retrouve à 60-70 % si nouvelle chirurgie	Conservation du sperme avant l'intervention
Succès de réalisation	> 99 %	> 99 %
Allergies à distance du geste	Non (si clips, ne contiennent pas de nickel)	Non
Risque	Très faible	Minimal
Complications	Très rares (technique chirurgicale, anesthésie) : 0,9 à 1,6 %	Minimales et bénignes (technique chirurgicale) : 0,4 %.
Ouverture du ventre	Très rare	Non
Risque vital / séquelles graves	Très faible risque (2-5/100 000)	Exceptionnel
Risque de grossesse	0,5 % selon l'OMS	0,15 % selon l'OMS
Risque de grossesse extra-utérine (GEU)	Si grossesse : 1/3 soit environ 0,17 % par an	Pas d'augmentation
Protection contre les IST	Non	Non
Change les hormones (âge ménopause...)	Non	Non
Diminue le risque de cancer de l'ovaire	Oui	Non
Anesthésie	Générale	Locale
Hospitalisation	1 jour habituellement (sortie le soir même)	Non nécessaire
Arrêt de travail	4 à 7 jours	1 à 2 jours
Durée intervention habituelle	< 30 minutes	< 30 minutes
Inconfort post-opératoire	Faible à minimal	Faible à minimal
Contrôle post-opératoire	Non obligatoire (visite post-opératoire)	Contrôle à 3 mois (spermogramme)