

Les questions que l'on se pose (« Questions Mansour »)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> o Quelles sont les principales préoccupations de la patiente ? o Quelle était le profil de saignement avant l'insertion ? o Date de début ? Implant palpable ou fils visibles ? Une grossesse envisageable ? | <ul style="list-style-type: none"> o S'agit-il d'une gêne fonctionnelle, d'une inquiétude sur la signification des saignements ? o Un profil pathologique avant pose aurait dû être exploré o La contraception ou les signes font-ils penser à un saignement lié à une éventuelle grossesse ? |
| <ul style="list-style-type: none"> o Descriptions (calendrier de saignement si possible): nb jours / mois, nb épisodes, post-coïtales ? o Douleurs abdominales ? SFU... o Des traitements peuvent-ils interférer ? | <ul style="list-style-type: none"> o Parfois les saignements sont mensuels comme des menstruations. Un saignement post-coïtal s'explore... o Saignement sur IGH ? Saignements urinaire d'une infection ? o Inducteurs enzymatiques de la CYP 3A4 (rifampicine, anti-épileptiques...) |
| <ul style="list-style-type: none"> o Y a-t-il un risque d'IST ? o De quand date le dernier FCU ? | <ul style="list-style-type: none"> o Les saignements pourraient être plus liés à une infection qu'à la méthode (Chlamydia...) o Le saignement pourrait-il être lié à une pathologie cervicale si suivi éradique. |

Si les réponses sont rassurantes et ne permettent pas d'orienter vers une cause organique ou de mésusage


< 6 mois

- o Ex. clinique si cela rassure la patiente +/- dépistage IST +/- FCU
- o Rassurer et faire le suivi
- o Ttt médical si la patiente est demandeuse

≥ 6 mois

- o Examen souhaitable
- o Si facteurs de risques Kc Endomètre (âge, poids...) => écho pelvienne
- o Si bilan ne retrouve rien => Ttt médical ou envisager une autre contraception

Traitement médical si indiqué



Persistance des saignements ou saignements insupportables ?

Si oui : counseling -> Re BERCER

- o Conseiller des alternatives et proposer une autre méthode si elle le désire

Pour les oestroprogestatifs sur 21, 21 jours + placebo, 24 jours + placebo, voir la fiche « effets de la pilule »